Hydrosol®

Polyvitaminé Pharma Développement

Solution buvable en gouttes 20 mL

Quelle est sa composition?
100 mL de solution buvable contiennent:

Vitamine A synthétique (concentrat de) forme huileuse	250000 UI
Ergocalciférol (Vitamine D2)	50000 UI
Tocophérol (Acetate d´)(Vitamine E)	100 mg
Thiamine (Chlorhydrate de) (Vitamine B1)	100 mg
Riboflavine (Phosphate de sodium) (Vitamine B2)	75 mg
Pyridoxine (Chlorhydrate de) (Vitamine B6)	100 mg
Nicotinamide (Vitamine PP)	500 mg
Acide ascorbique (Vitamine C)	2500 mg
Dexpanthénol (Vitamine B5)	200 mg

Excipients: Huile d´arachide, glycérol, propylèneglycol, huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée 40, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), saccharine sodique, arôme fraise, tetrarome orange, hydroxyde de sodium ou acide chlorhydrique, eau purifiée.

15 gouttes (0.6 mL) = 1500 UI de vitamine A et 300 UI de vitamine D.
20 gouttes (0.8 mL) = 2000 UI de vitamine A et 400 UI de vitamine D.
25 gouttes (1 mL) = 2500 UI vitamine A et 500 UI de vitamine D.

Quelle est la présentation existante? Solution buvable en gouttes. Flacon de 20 mL avec compte-gouttes.

A quelle classe pharmacothérapeutique appartient Hydrosol® Polyvitamine Pharma développement?
Vitamines (A: appareil digestif et métabolisme)

Quel est l´exploitant? Laboratoire Pharma développement - Chemin de Marcy - 58800 CORBIGNY-FRANCE.
Fabricant: Laboratoire PHARMA développement - Chemin de Marcy - 58800 CORBIGNY - FRANCE

Dans quels cas Hydrosol® Polyvitaminé Pharma développement doit-il être utilisé?
Ce médicament est indiqué pour prévenir ou traiter des troubles en rapport avec un régime alimentaire carencé ou déséquilibré.

Dans quels cas Hydrosol® Polivitaminé Pharma développement ne doit-il pas être utilisé?
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants:
Antécédents d´allergie à l´un des constituants, troubles de l´absorption des graisses, malabsorption chronique, thérapeutique associée interférant avec l´absorption de la vitamine A, hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), hypercalciurie (taux anormalement élevé de calcium dans les urines), lithiase calcique (calcul rénal), en association avec la lévodopa.
En cas de doute, il est indispensable de demander l´avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Quelles précautions devez-vous prendre lors de la prise de Hydrosol® Polyvitaminé Pharma développement?

Mises en gardes spéciales:
Les vitamines A et D sont présentes dans de nombreux médicaments. La vitamine D est également présente dans de nombreux laits pour bébé. Evitez de les associer à ce médicament car un surdosage en vitamine A uo D est susceptible déntraîner des effets indésirables graves, notamment chez le nourrisson. Respectez la posologie et la durée du traitement préconisées par le médecin.
Précautions d´emploi:
En cas d´apport complémentaire en calcium, consultez votre médecin.
Tous les besoins en sels minéraux et vitamines sont couverts par une alimentation équilibrée et diversifiée avec les aliments de base traditionnels (fruits, légumes, viande, œufs, poissons, céréales, produits laitiers). Votre médecin peut vous aider dans l´établissement d´un régime alimentaire équilibré, adapté à votre cas.

En cas de doute, n´hésitez pas à demander l´ávis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autre interactions:
Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.
Afin d´éviter d´éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - allaitement:
En cas de carence confirmée par votre médecin, ce médicament pourra être prescrit pendant la grossesse. Eviter l´administration de ce médicament pendant l´allaitement du fait du risque d´effet indésirable chez le nourrisson.
D´une facon générale, il convient au cours de la grossesse et de l´allaitement, de toujours demander l´avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients:
Butylhydroxyanisole, butylhydroxytoluène,parahydroxybenzoate de mèthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée 40, propylèneglycol.

Comment utiliser Hydrosol® Polyvitaminé Pharma Développement?
Posologie:
Adulte, adolescent : 25 gouttes par jour.
Enfant de 4 à 12 ans : 20 gouttes par jour.
Enfant de 1 à 3 ans : 15 gouttes par jour.
Cette spécialité n'est pas adaptée au nourrisson de moins de 1 an.
Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise:
il peut ne pas être adapté à un autre cas
Ne pas le conseiller à une autre personne

Mode d´emploi du flacon-gouttes:
Au moment de l'utilisation:
- enfoncer le bouchon avant de le tourner dans le sens de l'ouverture,
- retourner le flacon verticalement,
- attendre quelques instants sans secouer que l'écoulement goutte à goutte se produise,
- en cas de retard à l'écoulement, il peut être nécessaire de tapoter légèrement le fond du flacon.

Après usage:
refermer le flacon avec précaution afin de ne pas abîmer le compte-gouttes.
Mode et voie d´administration:
Voie orale. Ne pas injecter.
Les gouttes peuvent être diluées dans de l´eau du lait ou du jus de fruit, en s´assurant alors que toute la quantité de liquide sera absorbée.
Durée du traitement:
Respecter la posologie et la durée de traitement préconisées par le médecin.

Quels sont les effets indésirables possibles de Hydrosol® Polyvitaminé Pharma développement?
Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants. Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Comment Hydrosol® Polyvitaminé Pharma développement doit-il être conservé?
Ne pas dépasser la date limite d´utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne jamais laisser un médicament à la portée des enfants.

Dernière date de révision de la notice

Mai 2013

2006/D

PHARMA développement